



Auteure  
Mathilde  
Ryckaert



Pharmacie de La Poste  
62100 Calais



## Sur mon ordonnance, j'ai du Mucomyst®

**Ce médicament appartient à la famille des fluidifiants bronchiques**, aussi appelés mucolytiques. Son principe actif est la N-acétylcystéine. Il est prescrit dans les cas d'affections respiratoires récentes avec difficultés d'expectoration. En effet, les sécrétions bronchiques difficiles à évacuer par la toux peuvent s'infecter. Le Mucomyst® aide à fluidifier les sécrétions et facilite leur évacuation. Pour cela, il rompt les ponts disulfures des glycoprotéines présentes dans la phase gel du mucus.

Il est déconseillé d'y associer un produit antitussif, qui, lui, couperait la toux et empêcherait l'évacuation

du mucus. Il ne faudra pas l'utiliser chez une personne qui serait inapte à tousser par elle-même.

Il se présente sous forme de petits sachets, qu'il est recommandé de prendre 3 fois par jour, dilués dans un verre d'eau. On évitera de le prendre en fin de journée pour ne pas encombrer les bronches en position allongée.

Il n'est indiqué qu'à partir de 7 ans.

Il peut parfois provoquer de légers troubles digestifs.

Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin ou votre pharmacien.



### Le saviez vous ?

La N-acétylcystéine est également l'antidote du paracétamol, elle peut être utilisée dans les cas d'intoxications.